

Symptom vid PAS

PAS (Post Abort Stress) är en samling symptom som sorterar under en större diagnos som kallas PTSD (samma förkortning används i svenskan). Tidigare fanns PAS med på DSM-111R*, men har i nuvarande version tagits bort. Detta baseras troligtvis mer på ett politiskt beslut än på kliniska bevis, eftersom de kliniska bevisen bara blivit fler ang PAS.

Först följer en lista på allmänna symptom vid abortrelaterad stress, PAS, och sedan en lista på de specifika symptomen. Vid PAS får en del bara några få symptom medan andra kan ha ett flertal. Symptomen kan uppträda omedelbart efter aborten eller uppträda först flera år efter ingreppet.

Allmänna PAS-symptom (gäller även PTSD)

Alkohol- och/eller drogmissbruk

Depression

Isolering

Känslor av hjälplöshet

Lättare psykoser (overklighetskänslor)

Mardrömmar

Oro

Panik

Samvets kval

Sjunkande självuppfattning

Självmodsförsök

Sorg

Störningar i relationer

Sömnstörningar

Vrede

Ånger

*DSM står för Diagnostic and Statistical of Mental Disorders och är en handbok för psykiatri med standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar.

Specifika PAS-symptom

Oförmåga att knyta av till de egna barnen

Oro över ofruktsamhet

Plötsliga okontrollerbara gråtattacker

Psykosexuella störningar

Undvikande beteenden

Upptagenhet av att bli gravid igen

Årligen återkommande syndrom (runt årsdagar)

Ätstörningar

